

病例中,有数例重度中毒患者由于不适当地使用脲类复能剂导致死亡^[1,13,19]。但也有学者提出不能将禁用脲类复能剂的原则推广到所有氨基甲酸酯类^[3]。因此,有必要作进一步研究。③对症与支持疗法。如有烦躁不安、惊厥症状者,可用安定10mg。不宜用抑制呼吸的镇静剂。重度中毒时,要特别注意呼吸功能,保持呼吸道通畅,积极防治呼吸衰竭。切忌不适当大量输液,诱发与加重肺水肿。

参 考 文 献

1. WHO: Environ Carbamate pesticides: A general introduction, [Health Criteria 64:] Geneva: W-HC. 1986.
2. Hayes WJ. Pesticides Studies in Man, Chapter 8, Baltimore: Williams & Wilkins, 1982: 436~462.
3. Ecobichon DJ. Carbamic acid ester pesticides. In: Ecobichon DJ, Joy RM eds. Pesticides and Neurological Diseases. Florida: CRC Press Inc, 1982: 205~233.
4. 施寿康. 氨基甲酸酯杀虫剂的一些毒性问题, 农药 1981; (1):25.
5. Ferguson PW, et al. Carbofuran metabolism and toxicity in the rat, Fundam Appl Toxicol 1984; 4(1):14.
6. Wills JH, et al. Effects of oral doses of carbaryl on man, Clin Toxicol 1968; 1(3):265.
7. Reich GA, et al. Death due to a pesticide. New Engl J Med, 1966; 247:1432.
8. Liddle JA, et al. A fatal episode of accidental methomyl poisoning. Clin Toxicol 1979; 15(2):159.
9. 李天铎,等. 112例生产性呋喃丹中毒的调查报告. 中级医刊 1982; 17(6):51.
10. 马杰,等. 呋喃丹急性中毒108例临床分析. 化工劳动保护工业卫生与职业病分册 1983; (1):13.
11. 丁茂柏,等. 新农药中毒病例征集小结——急性呋喃丹中毒诊断与治疗问题的讨论. 中国农村医学 1985; (5):26.
12. 卢德新. 急性呋喃丹农药中毒109例报告. 劳动医学 1985; 2(3):14.
13. 徐家琪. 救治急性呋喃丹中毒182例的体会. 实用内科杂志 1985; 5(11):594.
14. 毛飘涯. 呋喃丹生产性急性中毒156例临床分析. 化工劳动保护工业卫生与职业病分册 1987; (1):45.
15. 张寿林,等. 8例急性生产性呋喃丹中毒临床分析. 卫生研究 1987; 16(5):39.
16. 朱映霞. 西维因急性中毒18例报告. 劳动医学 1984; 1(1):38.
17. 毛飘涯. 速灭威农药生产性中毒24例报告. 职业医学 1985; 12(1):33.
18. 江焕新. 急性叶蝉散农药中毒3例报告. 江苏医药 1985; 11(10):32.
19. 安徽省桐城县卫生防疫站. 急性重度叶蝉散农药中毒二例报告. 劳动医学 1985; 2(3):79.
20. 方克美,等. 混合农药的毒性与复合农药中毒. 农药 1984; (2):27.
21. 张金松,等. 全血、红细胞、血浆胆碱酯酶活性微量、快速比色测定法. 卫生研究 1987; 16(6):36.
22. WHO: Tech Rep Ser No 677; Recommended health-based limits in occupational exposure to pesticides. Geneva: WHO, 1982.
23. Lauwerys RR. Industrial Chemical Exposure: Guidelines for Biological Monitoring. California: Biomed Pub, 1983: 142.
24. 高晓之,等. 呋喃丹作业人员尿中呋喃丹原型及代谢物气相色谱测定法. 卫生研究 1987; 16(4):39.

韭菜所致亚硝酸盐中毒

辽宁中医学院附属医院 张贵元 赵玉琢

我们曾收治因进食腐烂变质韭菜而致全家中毒病例。其主要表现为进食后不久,突然出现头晕、心悸、气短、无力、恶心、呕吐、腹痛,口唇、甲床及全身青紫。5人中有2人血压下降,一人全身抽搐、意识不清。病情与进食量有密切关系。经吸氧、呼吸兴奋剂、维生素C及美蓝(2mg/kg)治疗后好转,2

天后痊愈出院。对食剩的饺馅进行化验(一滴饺馅浸出液加一滴联苯胺冰醋酸饱和液,呈棕红色)证实含亚硝酸盐。韭菜、小白菜、菠菜、甜菜等均含有较多硝酸盐,腐败变质后易为细菌还原成亚硝酸盐而致中毒,应引起注意。