

• 有奖竞赛 •

工业医学基础知识竞赛

一、是非题

1. 发生职业性急性中毒时, 现场抢救十分重要, 做好这项工作, 平时有充分准备是关键。

2. 吸入较大量光气后, 最主要的措施是立即给予胸部摄片, 以早期发现肺水肿。

3. 皮肤、粘膜呈樱桃红色是急性一氧化碳中毒必定出现的体征。

4. 一经诊断急性职业中毒性脑病, 不管在什么情况下, 应立即予以高压氧治疗, 以防止因缺氧而加重脑水肿。

5. 测定尿汞有几种方法, 正常值上限各异, 因此尿汞含量不能代表体内汞的负荷。

6. 尿锰、发锰、粪锰都不能作为慢性锰中毒诊断的主要指标。

7. 急性职业中毒常以某一系统的病变较为突出, 但治疗既要有重点, 又应有全面观点及预见性, 才能取得较好的疗效。

8. 当急性重危中毒病员就诊时, 首先应立即予以病因治疗, 因为这是针对毒物所采取的紧急措施。

9. 急性砷化氢中毒引起血管内溶血, 皮肤、粘膜常有明显黄疸, 尿内胆红素含量较高, 呈深褐色。

10. 检测第1秒用力呼气量是衡量小气道阻力增大最理想、最敏感的指标。

二、选择题

1. 国务院颁布《关于防止厂矿企业中矽尘危害的决定》是在: ①1952年; ②1954年; ③1956年。

2. 含有80%以上游离二氧化硅的生产性粉尘, 车间空气中最高允许浓度(mg/m^3)是: ①1; ②2; ③4。

3. 吸入呼吸道的粉尘, 若几乎全部滞留在鼻腔内, 则被阻尘粒的直径(μm)是: ① >10 ; ② >5 ;

③ >2 。

4. 药物“反应停”(酞胺哌啶酮)曾被认为是安全药物, 但在临床应用后, 发现有明显的: ①致癌作用; ②致畸作用; ③致敏作用。

5. 口服樟丹、黑锡丹等含铅药物所致中毒, 常有: ①严重口腔溃疡; ②腹绞痛; ③腹泻、便秘。

6. 急性有机溶剂中毒时, 注射肾上腺素可诱发: ①心室颤动; ②急性心肌炎; ③充血性心力衰竭。

7. 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G-6-PD)缺陷者是职业禁忌证: ①苯作业; ②汞作业; ③苯的氨基硝基化合物作业。

8. 急性中毒患者出现复视是由于: ①视神经病变; ②视网膜病变; ③眼外肌麻痹。

9. 高山肺水肿采用吗啡治疗: ①有益; ②无效; ③禁忌。

10. 严格执行“车间空气中有害物质的最高容许浓度”是属于: ①一级预防; ②二级预防; ③三级预防。

三、问答题

1. 请谈谈劳动卫生立法的目的以及你的意见。

2. 请对本刊已出版的三期杂志提出批评、建议。

竞赛须知

1. 参赛者另用稿纸答题, 标清各题题号, 题号后书写答案;

2. 请将本页右下角“竞赛”印花剪下, 贴在信封右上角;

3. 答案截止日期: 1989年8月31日, 以当地邮戳为准;

4. 答案请寄: 辽宁省沈阳市铁西区南十一西路18号, 《中国工业医学杂志》编辑部

“职业病基础知识竞赛”答案及评审结果

1988年第1期“职业病基础知识竞赛”答案

一、是非题

1. (+); 2. (-); 3. (+); 4. (-); 5. (+); 6. (-)。

二、选择题

1. A; 2. B; 3. D; 4. D; 5. B; 6. B; 7. C; 8. D; 9. D; 10. C; 11. B; C; 12. B;

本竞赛题刊出后, 广大读者积极踊跃参加竞赛, 对此编辑部表示感谢。经专家评审, 下列同志为本次竞赛获奖者

张果升	杨正高	谈桂兰	李道福	竞赛
黄卫群	盖修海	郭湘云	郭宝科	
井丽荣	徐成伟	洪长福	郭棣华	
沈芸芝	张仰荣	魏礼仪	陈志先	
李克勇	周荣富			