

续表

组 分	标 本	参 考 值 (正常值)		
		法 定 单 位	换算系数	旧 制 单 位
镉	全血	0.15~7.7 μ mol/L	0.17	0.9~45.5 μ g/dl
铅: 儿童	全血	<1.45 μ mol/L	0.048	<30 μ g/dl
成人	全血	<1.93 μ mol/L	0.048	<40 μ g/dl
砷	全血	0.03~0.82 μ mol/L	0.133	0.2~6.2 μ g/dl
硒	全血	1.27~4.32 μ mol/L	0.127	10~34 μ g/dl
锌	血清	7.65~22.95 μ mol/L	0.153	50~150 μ g/dl
	红细胞	184~199 μ mol/L	0.153	1200~1300 μ g/dl
一氧化碳				
非吸烟者	全血	HbCO部分<0.02	0.01	<2% HbCO
吸烟者	全血	HbCO部分<0.10	0.01	<10% HbCO
胆碱酯酶活性	血清	0.80~1.00	0.01	80~100%
骨髓增生度	骨髓	有核细胞占成熟红细胞的 0.01~0.10为增生活跃	0.01	有核细胞占成熟红细胞的 1~10%为增生活跃
尿液比重	尿	1.015~1.025	—	1.015~1.025
尿渗透量 (压)	尿	最大范围40~1400mmol/L 一般600~1000mmol/L	1	最大范围40~1400mOsm/kg 一般600~1000mOsm/kg
糖定量 (成人)	24h尿	0.56~5.0mmol/24h	0.0056	100~900mg/24h
δ -氨基 γ -酮戊酸	尿	7.6~45.8 μ mol/L	7.63	1~6mg/L
铬	尿	0.2~1.9 μ mol/L	192	0.001~0.01mg/dl
汞, 硝化法	尿	<250nmol/L	4.99	<50 μ g/L
蛋白沉淀法	尿	<50nmol/L	4.99	<10 μ g/L
肌酐: 成人 男	24h尿	7~18mmol/24h	0.0088	800~2000mg/24h
女	24h尿	5.3~16.0mmol/24h	0.0088	600~1800mg/24h
甲醇 (职业接触)	尿	<1.6mmol/L	0.31	<5mg/dl
磷 (无机) 成人	24h尿	22~48mmol/24h	0.032	700~1500mg/24h
马尿酸	24h尿	<3.3mol/24h	5.58	<0.60mg/24h
锰	尿	0.18 μ mol/L	18.2	<0.01mg/L
铍	24h尿	<5.55nmol/24h	111	<0.05 μ g/24h
铅	尿	<0.39 μ mol/L	4.83	<0.08mg/L
砷	尿	1.8~1.9 μ mol/L	13.3	0.135~0.139mg/L
硒	尿	0.13~1.27 μ mol/L	0.0127	10~100 μ g/L
锌	24h尿	2.3~18.4 μ mol/24h	15.3	0.15~1.2mg/24h
粪卟啉定量 成人	24h尿	75~240nmol/24h	1.5	50~160 μ g/24h

乙二胺接触性皮炎30例

南京航空学院医院 王连生 西北工业大学医院 校玉山

本文报道环氧玻璃钢生产过程中所发生的30例接触性皮炎。该生产分模型、调胶配料、固化浇铸与加工四道工序。接触物主要为:环氧树脂、乙二胺、间苯二胺、滑石粉与玻璃纤维等。环境中烟雾弥漫,且可闻及强烈刺激性臭味。工人徒手操作。

30例操作工均发生接触性皮炎。其中男性20例,

女性10例;年龄20~52岁,工龄最短1月,最长13年。

6例以往有过敏史。皮疹好发于手指、手背、前臂和面部暴露部位,重者波及全身。多呈粟粒红色丘疹,散在或集簇分布。间有红斑与水疱。自觉瘙痒,抓后糜烂、结痂。如脱离接触,经对症治疗,皮疹大都在1周内消退,再接触则复发。