

己二腈中毒6例临床资料

例	年龄(岁)	接触方式及时间	症状及体征	实验室检查	治疗与转归
1	37	皮肤接触 9小时	头昏, 恶心, 呕吐乏力, 球结膜充血, 反复惊厥, 呼吸心跳骤停	尿硫氰酸盐0mg/L, 血K ⁺ : 4.0mmol/L, 血气, 呼碱代酸 脑电图轻度异常	心肺复苏术 吸入亚硝酸异戊酯1支, 静注硫代硫酸钠13.8g, 痊愈。
2	45	皮肤接触 5小时	头昏, 无明显阳性体征	尿硫氰酸盐1.8mg/L 血K ⁺ : 3.3mmol/L 脑电图正常	吸入亚硝酸异戊酯1支, 静注硫代硫酸钠3.2g, 痊愈。
3	40	皮肤接触 9小时	头昏、恶心、呕吐、眼花、轻度 呼吸困难, 无明显阳性体征	尿硫氰酸盐0.9mg/L, 血K ⁺ : 3.2mmol/L 脑电图轻度异常	吸入亚硝酸异戊酯1支, 静注硫代硫酸钠3.2g, 痊愈。
4	35	200~280°C 烫伤	抽搐, 烫伤面积98%, I、 II度占80%		入院后20分钟呼吸心跳停 止, 死亡。
5	28	200~280°C 烫伤	抽搐, 呼吸困难, 烫伤面 积85%, I、II度占70%, 头 皮和右小腿软组织撕裂伤		入院后2小时静注硫代硫 酸钠2.56g, 10分钟后呼吸, 心跳骤停死亡。
6	25	200~280°C 烫伤	呼吸困难, 全身青紫, 烫伤 面积75%, I、II度占40%, 右面部, 右角膜, 颈部, 前 胸, 背部, 四肢大部水泡, 皮肤剥脱	尿硫氰酸盐2.4mg/L 血K ⁺ : 2.5mmol/L 尿常规: 蛋白(++) 颗粒管型: 0~1/Hp	吸入亚硝酸异戊酯6支, 静注硫代硫酸钠101.76g 死亡。

氯鼠酮中毒2例报告

浙江武义县第一人民医院儿科 (321200) 赵德春

【例1】女, 9岁, 住院号49189。误服混有氯鼠酮的糯米; 约取4市两(含氯鼠酮1ml左右), 用酒精炉煮熟, 服量近3/4。1小时后家长发现急送医院。体检: 体温36.3°C, 呼吸24次/分, 脉搏96次/分, 血压12/6kPa。面色苍白, 全身皮肤粘膜无出血点。心肺(-)。腹部检查(-)。神经系统(-)。入院后速给催吐、洗胃处理。实验室检查: Hb98g/L, WBC $4.3 \times 10^9/L$, N0.5, L0.5; 血小板 $150 \times 10^9/L$, BT3分, CT8分(试管法)。大便隐血(-)。肝功能、心电图、胸片、血沉皆正常。入院后用维生素K₁每日60mg, 未加其它止血药。入院第2天, 发现眼周皮肤及眼球结膜有针尖样大小出血点。无便血、尿血、牙龈出血。入院第6天出血点消退, 无其它部位出血现象。第8天停药观察。第12天出现鼻衄1次, 约80ml左右。再次用维生素K₁10mg肌注, 第13天血止。第16天停药出院。随访一周无出血。

【例2】女, 14岁, 系例1表姐, 住院号49190。

与例1同时误服, 但量仅占1/4。体检: 体温36.5°C, 呼吸22次/分, 脉搏92次/分, 血压13/8kPa。皮肤粘膜无出血点。心肺(-)。腹部检查(-)。神经系统(-)。入院后同例1给予催吐、洗胃。实验室检查: Hb110g/L, WBC $6.2 \times 10^9/L$, N0.66, L0.34; 血小板 $185 \times 10^9/L$, BT3分, CT7分(试管法)。大便隐血(-)。肝功能、血沉、心电图、胸片皆正常。入院后用维生素K₁每日80mg, 未见出血现象。第8天停药观察。第10天出现鼻衄1次, 出血量约40ml左右; 咽部、上腭、口腔粘膜大片出血点。无血便、血尿、牙龈出血。复用维生素K₁30mg。第13天出血点消退。第18天停药出院。随访一周无继续出血现象。

讨论: 氯鼠酮系新型灭鼠药。机理为抑制凝血酶原合成, 引起皮肤粘膜广泛出血而死亡。此2例患儿服药10天后出血现象仍较严重。我们体会: 本药在体内滞留时间较长, 中毒患者应观察半月左右; 个体差异大; 维生素K₁应持续应用10天以上。