度,13例(4.47%)为重度。我们对291例患者作以下分析:(1)分析 PaO_2 与煤工尘肺年龄组之间的关系:结果50、60、70岁各年龄组与 PaO_2 无明显关系。(2)分析 PaO_2 与紫绀的关系:将紫绀分为无、轻、中、重度四级, PaO_2 在10.66kPa(80mmHg)以下者无紫绀27例(9.28%),轻度155例(53.36%),中度84例(28.87%),重度25例(8.59%)。(3)分析 PaO_2 与呼吸困难程度关系:将呼吸困难分为无、轻、中、重四度, PaO_2 在10.66kPa(80mmHg)以下者无呼吸困难20例(6.87%),轻度89例(30.58%),中度121例(41.58%),重度61例(20.96%)。(4)分析 PaO_2 与肺部感染的关系:经X线检查低氧血症的291例煤工尘肺中肺部感染者171例,占58.76%;同时合并慢性支气管炎者216例,占74.23%;肺部有罗音等阳性体征者218例,占74.91%;白细胞增高者148例,占50.86%;不增高者143例,占49.14%。(5)分析 PaO_2 与心电图异常情况:结果291例低氧血症煤工尘肺中,心电图以顺时针转位,窦性心动过速ST—T变化为主,三者占心电图改变的53.38%。(6)分析 PaO_2 与死亡的关系:291例低氧血症煤工尘肺患者死亡17例,死亡率为5.84%, PaO_2 在7.99kPa(60mmHg)以下可诊断为呼吸衰竭,其中死亡14例,占死亡总数的82.35%。从死因分析中看出因肺性脑病死亡者有11例,占64.71%,居首位。

2 讨论

本文以动脉血氧为轴,将 PaO_2 在10.66kPa(60mmHg)以下291例低氧血症的煤工尘肺进行临床分析。401例住院煤工尘肺中有291例 PaO_2 在10.66kPa

(60mmHg)以下,占72.87%,说明煤工尘肺在住院患者中低氧血症发病率很高。其中 PaO_2 在7.99kPa(60mmHg)以下达到呼吸衰竭标准有91例,占32.27%。本文报道60岁以上老年组煤工尘肺240例,易发生呼吸衰竭,预后不良。

291例低氧血症煤工尘肺年龄组偏高,平均年龄63.62岁,系属老年组,年龄组与 PaO_2 之间无显著性差异,可能与煤工尘肺发病年龄偏高有关。不同的氧分压与紫绀有明显差异,低氧血症患者也可以不出现紫绀。本文报道无紫绀者27例,占9.28%,不同氧分压与呼吸困难有明显差异,随氧分压降低,呼吸困难明显加重,以中度和重度呼吸困难居多达182例,占62.54%,呼吸困难与氧分压降低呈正相关。笔者报道401例煤工尘肺患者出现291例低氧血症,其中171例(58.76%)合并肺部感染,是低氧血症的主要原因之一。国内有人曾报道60%老年死者有肺部感染。这也是老年组煤工尘肺的特征之一。

291例低氧血症煤工尘肺中有143例白细胞不增高,占49.14%,但多有核左移现象,是老年人煤工尘肺特征之一,这与老年患者器官组织老化、反应性低下及煤工尘肺患者免疫力低下有关,应引起重视。本文291例低氧血症患者心电图改变,以窦性心动过速、ST—T改变为主,反映出心肌缺氧。从低氧血症死亡患者的死因分析中看出第一位是肺性脑病,多发生在 PaO_2 7.99kPa(60mmHg)以下,故在 PaO_2 降低时应积极防治肺性脑病。测定尘肺病人的 PaO_2 ,了解患者低氧血症的情况,是简便宜行的方法之一,可以早期发现、早期防治,降低死亡。

解磷定在胃内解毒的临床应用

浙江省余杭县瓶窑医院 (311115) 唐玉泉 杨浓怡 王争鸣 孙荣强 胡建芳

有机磷农药在胃内吸收快,常规阻止毒物吸收的方法是洗胃。由于洗胃需要一定的设备和时间,同时在临床工作中遇到病人情况很差、机器故障、停电、胃管阻塞等情况,会给抢救增加困难。据此,我们用解磷定灌胃及口服进行胃内解毒。现将动物实验及临床观察结果报告如下。

1 动物实验

1.1 实验材料

1.1.1 小鼠(取材于浙江省中医学研究所)20只,

体重20g,雌雄各半。

1.1.2 解磷定注射液:上海海普药厂生产,批号890351。

1.1.3 甲胺磷液:浙江省湖州菱湖化学厂生产,批号890861。

1.2 实验方法

1.2.1 小鼠随机分成A、B、C3组。

1.2.2 A、B、C3组均给全数致死量甲胺磷(40mg/kg)灌胃。染毒后,A组不作任何处理;B组紧接着灌入解磷定400mg/kg;C组紧接着灌入0.9%氯化钠

注射液2ml。

1.3 实验结果

1.3.1 A组和C组17~20分钟内全部死亡。

1.3.2 B组全部存活。

2 临床病例观察

2.1 临床观察30例,其中轻、中和重度中毒各10例。有机磷农药品种:甲胺磷20例,乐果5例,敌敌畏5例。服毒半小时内来院20例,半小时后10例。昏迷10例,清醒20例,阿托品最大用量100mg以上,最小50mg。该组病例(治疗组)经灌胃和口服给予解磷定,一般在洗胃前在胃管内推注解磷定0.5~1.0g,洗胃后再推注解磷定0.5g保留。抢救成功后,每日给病人分3次口服解磷定0.5~1.0g。除1例来院较晚死于呼衰,其余均存活。

2.2 另取中毒情况与治疗组基本相似的30例作对照。治疗组与对照组相比,阿托品化量平均减少30.3%,阿托品总量平均减少26.3%,症状消失时间平均缩短21.9%,住院日平均减少21.1%;治疗组无1例反跳,抢救成功率96.67%。

3 典型病例

患者骆某,男,33岁,住院号910441,口服甲胺磷原液250ml约半小时来院。来院时面色紫绀,呼吸停止,心率60次/分,律齐,心音低,四肢厥冷。即刻人工呼吸,气管插管,静脉开放静推阿托品,因无法洗胃,插入小号胃管注入解磷定1.5g,约半小时后呼吸恢复,情况好转。洗胃消毒,因胃管阻塞洗胃达2小时之久。阿托品化时阿托品总量405mg,同时口服解磷定0.25g,一天两次,共3天,住院10天,治愈

出院。

4 解毒机理

有机磷酸酯类化合物均具有下列的基本化学结构:

式中R及R'是烷基、烷氧基、苯基或其它基团, X是烷氧基、卤素或其它基团, Y一般是氧或硫。碘解磷定分子中肟的结构部分与有机磷酸酯中磷原子亲和力较强,直接结合,成为无毒的磷酰化解磷定由尿排出。

5 讨论

解磷定为季铵氮类药物,口服胃肠道不吸收,可与胃肠道残留的有机磷直接结合而起解毒作用。我们在抢救成功后头3天给病人口服解磷定,剂量0.5~1.0g/次,每日3次。同时仍按常规给予其它治疗,有效防止“反跳”。该法对服毒早期病人更为有效,特别适应基层。

急性有机磷农药中毒迟发呼吸衰竭16例临床分析

江苏省南通市通海中心医院(226311) 戴耀曾 孙杰

急性有机磷农药中毒经抢救症状消失或减轻后,猝发呼吸衰竭是死亡的主要原因之一。我院自1985年6月至1991年7月抢救有机磷农药中毒209例,出现迟发呼吸衰竭16例,发病率占7.6%。为总结经验教训,特分析报告如下。

1 一般资料

1.1 资料来源 为我院内科1985年6月至1991年7月住院抢救的急性有机磷农药口服中毒病例,经洗胃、

应用阿托品和复能剂等综合抢救措施后,病情一度好转而猝发呼吸衰竭,不包括入院时呼吸衰竭及住院时间不足2小时的死亡病例。

1.2 性别与年龄 男7例,女9例;最小19岁,最大60岁,其中20~50岁13例,平均年龄34.5岁。

1.3 农药品种及服毒剂量 服甲胺磷共3例,2例约100ml,1例约200ml;服乐果10~150ml 9例,其中8例30ml,平均约60ml;服氧化乐果1例,3例约50~150ml,另1例剂量不详。