碎车间接尘工人为 50 人。

1.2 方法

1.2.1 粉尘的测定 粉尘浓度、分散度和游离二氧化硅含量按《作业场所空气中粉尘测定方法》(GB5748-85) 执行。

1.2.2 肺功能测定 接尘作业人员体检按《尘肺 X 线诊断标准及处理原则》执行。

2 结果

2.1 劳动卫生学调查

2.1.1 一般概况 该矿建于 50 年代, 由于建矿时规模小, 故生产设备简陋, 1970 年扩建中型矿山, 生产设备为半机械化, 防尘设备一般, 该矿为露天开采, 有 2 个矿区和 1 个制粉车间, 其生产工艺为采矿→运输→分级选矿→晾晒→粉碎→包装→成品入库。373 名接尘工人中, 目前已发现 I 期尘肺 5 人, 0⁺者 26 人。

2.1.2 粉尘测定资料 膨润土在水中呈胶状, 能膨胀 5~10 倍, 有粘性, pH 值 7~9.7, 耐火性小, 水融性差。

该膨润土建矿初期由于设备简陋, 粉碎车间粉尘浓度高达 258.5 mg/m³, 最低为 4.6 mg/m³, 详见图 1。粉尘分散度小于 5 μ m 的占 52%, 5~10 μ m 者占 35%, 10 μ m 以上者 13%; 粉尘中游离 SiO₂ 含量为 8.20%。

图 1 某膨润土矿粉碎、包装车间历年粉尘浓度

2.2 接尘工人体检情况

对该矿 373 名接尘工人自 1975 年以来所拍胸片进行了详细审阅, 1975~1993 年在粉碎车间接尘工人中发现 5 名尘肺患者, 发病率占接尘工人的 10%, 占全矿接尘工人的 1.34%。5 名尘肺患者发病工龄最短为 21 年, 最长者为 24 年, 平均为 22.2 年; 最小发病年龄为 49 岁, 最大 57 岁, 平均为 53 岁。0⁺26 人(其中 21 人为粉碎工, 5 人为包装工), 占全矿接尘工人的 6.97%。接尘工人的肺功能检查提示小气道通气功能轻度损伤。

2.3 尘肺患者的临床表现

5 名患者均有轻度咳嗽、胸闷、气短、肺功能有轻度损伤。

膨润土尘肺的 X 线形态学改变与中等含矽量粉尘所致尘肺基本相似。主要为肺门轻度增大, 肺纹理增强并伸延至外带, 但无中断现象, 两侧中下肺野有散在的类圆形小阴影, 其密集度为 I 级, 阴影较淡, 边缘不甚清晰, 基底部含气量增多。

3 讨论与分析

有关膨润土粉尘危害的国内外文献较少。本研究的现场调查发现, 膨润土是铝的矽酸盐, 游离 SiO₂ 含量较低(8.2%), 故其危害性较低, 但长期接触较高浓度的粉尘亦可致尘肺发生, 膨润土加工过程中环境粉尘浓度较高, 在 4.6~257 mg/m³ 浓度下, 373 名接尘工人有 5 人患 I 期尘肺, 累计患病率 1.34%, 平均发病工龄 22.2 年, 表明长期接触较高浓度的膨润土粉尘可以损伤肺组织, 引起尘肺。

曾昭玉^[2]所作的动物体内外实验表明, 膨润土粉尘有细胞毒性, 能导致 AM 损伤, 有轻度致肺纤维化作用, 其致病能力明显低于石英尘。

由于该膨润土粉尘扩散性大, 难以治理, 粉尘浓度超标严重, 建议企业主管部门和矿山应加强防尘工作, 安装高效的防尘设施, 以保护接尘工人的身体健康。

参考文献:

- [1] 任磊夫. 粘土矿物与粘土岩[M]. 北京: 地质出版社, 1992. 80-95.
- [2] 曾昭玉. 车间空气中膨润土粉尘卫生标准的研究[J]. 中华劳动卫生职业病杂志, 1998, 3(3): 177.

某合资金矿汞中毒调查报告

Investigation on mercury poisoning at a joint-venture gold mine

官湘建, 徐 健

GUAN Xiang-jian, XU Jian

(三明市职业病防治院, 福建 三明 365000)

摘要: 对某合资金矿汞危害情况进行了调查, 发现该金矿无任何排毒措施, 职业危害十分严重。并对中毒工人进行了驱汞治疗, 取得了较好的疗效。指出应重视汞接触工人的防治工作。

关键词: 汞; 冷原子吸收; 防治

中图分类号: R135.13 **文献标识码:** B

收稿日期: 2000-08-08; 修回日期: 2000-09-20

作者简介: 官湘建(1960-), 女, 湖南人, 主管技师, 从事卫生检验工作。

文章编号: 1002-221X(2001)01-0037-02

某金矿于 1996 年由县政府与地质队合资筹办。为了解其汞危害情况, 我们对此矿进行了调查, 报告如下。

1 劳动卫生学调查

该金矿井下开采出的矿石, 经过破碎、球磨、搅拌、浮选, 出现的粗颗粒金, 采取重选及汞回收, 回收后的汞金盛入搪瓷脸盆, 放在电炉上加温到 200~300℃, 汞蒸发后即得金。每月土法炼金 1 次, 每次用汞金 8~10kg, 其中自然金约 40%。

生产过程中工人们均不戴口罩，炼金的用具直接放置在实验室内。由于怕汞罐丢失，一位工人在实验室居住，汞罐即放在床下。

生产过程是敞开式的，到处可见汞蒸气凝结的汞珠，生产场所没有任何通风排毒设施。

2 汞危害情况调查

2.1 该矿从事汞作业者9人，有化验、冶炼、汞板收金工等，其中男7人，女2人。年龄25~63岁，接汞工龄1~3年。据调查，其中6人经常头昏，食欲不振，周身乏力，严重的出现口腔溃疡、牙龈肿痛等。

2.2 对接触汞的9人进行了尿汞测定（测汞仪法：冷原子吸收法），结果尿汞平均值为230.6nmol/L（186.9~669.9nmol/L），其中超过正常参考值上限（100nmol/L）的有5人，占55.6%。经市职业中毒诊断小组诊断汞吸收3例，慢性轻度汞中毒2例。

3 治疗

3名汞吸收者口服二巯基丁二酸0.5g，每日3次，服3天，停4天。3疗程后，尿汞值低于100nmol/L。2名汞中毒者收入我院治疗，肌注二巯基丁二酸钠0.125g，每日1次，用3天，停药4天为1疗程，取24小时尿测定尿汞，4个疗程后，尿汞值低于100nmol/L。1个月后治愈出院。

4 讨论

该合资金矿在没有任何防毒措施的情况下，直接将汞金进行敞开式烧炼提金，加之从业者缺乏对汞危害性的认识和缺乏基本防护知识，是导致汞中毒的直接原因。

有关部门应引起高度重视，改革冶炼工艺，改进生产设备，并加强通风排毒，降低空气中汞蒸气浓度。同时加强劳动卫生监督和劳动保护的宣传教育，提高工人的自我防护意识，做好就业前和每年1次的定期体检，避免汞对工人的危害。

· 病例报告 ·

热铬酸钠溶液烫伤后 急性肾功衰竭 1例报告

王肖蓉¹，田畴涛¹，刘丽君¹，张卫国²

(1. 洛阳医专附属医院烧伤科，河南 洛阳 471003；

2. 洛阳市职业病防治所，河南 洛阳 471000)

患者，女，23岁。于1999年1月25日下午7时在工作中不慎跌入含30%铬酸盐（钠）的热水池中，及时被人救出。水温约80℃。患者双小腿及双足背烫伤。仅用自来水冲洗创面，未使用硫代硫酸钠等溶液清洗。尔后在当地诊所清创，包扎创面，立即静脉输葡萄糖和生理盐水（量不详）。输液后一直无尿，曾给20%甘露醇、654-2、速尿，用后仍无自行排尿。在伤后23小时予以导尿，导出膀胱内残尿500ml，继之又无尿。因病人寒战、高热、呕吐、无尿，于1999年1月27日晚7时30分转入我院。入院时病人意识清楚，体温39.2℃，呼吸23次/分，脉搏114次/分，血压120/82.5mmHg（16/11kPa）。两肺无干湿音；心音有力，心律齐；腹平软，肝脾未触及。双小腿及双足背泡皮已掉，烫伤创面为12%，Ⅲ度1%。查尿常规：白细胞（++），蛋白（+++），尿糖（+），红细胞（++++）。肝功能：谷氨酸转氨酶221.8IU/L，天冬氨酸转氨酶358.7IU/L，乳酸脱氢酶1923.2U/L，总蛋白45.5g/L，白蛋白29.6g/L，球蛋白17.7g/L。血白细胞10.3×10⁹/L，Hb108g/L，BPC102×10⁹/L。诊断：急性肾衰。

入院后，立即给10%葡萄糖500ml+2%普鲁卡因50ml+氨茶碱0.5+维生素C2克；速尿20mg。仅从导尿管流出尿液6ml。1月28日8时输入1500ml液体（12小时）后仍无尿。快速静脉滴入10%葡萄糖500ml+速尿60mg+酚妥拉明20mg+多巴胺20mg，每天1组。另输10%葡萄糖300ml+50%葡萄

糖60ml+多巴胺40mg+维生素C2克+ATP40mg+辅酶A100U+胰岛素8U，每日2组。每日输液2320ml，尿量7ml/24小时。1月29日又加用速尿200mg静脉推注，每日1次。每日给速尿总量260mg。因病情危重，心率170次/分，体温39.2℃，血压80/60mmHg，呼吸40次/分，而未能上透析机。至1月30日开始肾血液透析，隔日1次，共4次。在我院治疗第7天尿量开始增加，330ml/d，肾功能也逐日好转，见表1。

表1 肾衰治疗前后统计结果

肾透析情况	尿量 (ml/d)	血肌酐	血尿素氮	CO ₂ CP
透析前	7	857	24	15
第1次透析后	48	952	24	17
第2次透析后	330	636.8	19	19
第3次透析后	1405	500.7	18	20
第4次透析后	3055	481.4	23	22
透析后10天	4825	272	13	26
透析后13天	2990	180	9	22

在我院治疗期间，大便潜血阳性，静滴甲氧咪呱0.4q8h，安络血10mg，im，q8h。抗生素用凯兰欣3.0q12h静脉滴注，新福欣1.5q8h静脉滴注。住院28天痊愈出院。

讨论 病人掉入热铬酸钠池中时间较短，烫伤面积仅为12%，却致急性肾衰；因为六价铬可经皮吸收，特别易经受损皮肤吸收。铬可经呼吸道、胃肠道和皮肤进入体内，此病人伤前在这个民办小厂工作2年，平日无防护措施（比如穿戴防护衣、口罩，通风排气），可能已有蓄积性中毒。本次烫伤，诱发加重了肾脏损害，以至发生急性肾衰。

诊断的主要依据是明确的铬接触史。铬可造成肾组织坏死，肾小管细胞核消失，原浆模糊不清或凝成块状，间质血管扩张郁血。病人烫伤入院，忽视了铬的危害，早期没有予以肾保护性治疗，以至发生急性肾衰，今后应引以为戒。

（收稿日期：1999-11-24；修回日期：2000-06-08）