· 实验研究 ·

三氯乙烯致敏小鼠体内补体 C3、C4b 表达水平研究

Changes of complements C3 and C4b expression in trichloroethylene-sensitized BALB/c mice

张家祥¹, 查晚生¹, 王峰¹, 江涛¹, 许述海¹, 沈彤², 朱启星^{1,2}ZHANG Jia-xiang¹, ZHA Wan-sheng¹, WANG Feng¹, JIANG Tao¹, XU Shu-hai¹, SHEN Tong², ZHU Qi-xing^{1,2}

(1. 安徽医科大学公共卫生学院劳动卫生与环境工程系, 安徽 合肥 230032; 2. 安徽医科大学第一附属医院皮肤研究所, 安徽 合肥 230032)

摘要: 选取 75 只雌性健康 BALB/c 小鼠, 随机分成空白对照组、溶剂对照组、TCE 处理组。TCE 处理组小鼠致敏率达 36.5%。24 h、48 h、72 h、7 d 致敏组血清 C3a-desArg、C4b 浓度与空白对照组、溶剂对照组及相对应的未致敏组相比有明显升高, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。通过 RT-PCR 检测, 灰度值分析显示 24 h、48 h 致敏组与空白对照组、溶剂对照组、相应未致敏组相比 C3、C4b mRNA 表达明显增强 ($P < 0.05$), 但 72 h 致敏组 C3、C4b mRNA 有明显的降低 ($P < 0.05$)。提示 TCE 对于 BALB/c 小鼠皮肤有致敏作用, TCE 致敏组小鼠可能存在一定程度的补体活化。

关键词: 三氯乙烯; BALB/c 小鼠; 补体; C3; C4

中图分类号: R992; O623.221 **文献标识码:** B

文章编号: 1002-221X(2013)01-0035-03

三氯乙烯 (trichloroethylene, TCE) 是工业上广泛使用的一种有机溶剂, 并且短期内未找到替代品^[1]。在我国职业性三氯乙烯药疹样皮炎 (DMLT) 已成为 TCE 接触工人健康危害的突出问题。DMLT 的发病机制目前不是很清楚, 有研究发现 TCE 可以引起急性中毒性肝损伤和免疫介导的肝损伤, 皮炎的发生和肝损伤有一定的相关性^[2,3]。肝脏是补体产生的重要器官, 补体是机体天然免疫系统的重要分子物质, 补体被激活产生活化物质形成级联反应引起补体成分的相互作用, 补体系统活化途径目前已知的有 3 条^[4]。C3 和 C4 在补体系统激活过程中起着关键的作用。本研究通过整体动物实验的方法, 检测 TCE 处理小鼠血清中 C3a-desArg、C4b 数量的变化, 以及采用 RT-PCR 检测肝脏组织中 C3、C4b 的基因表达情况, 为进一步阐明三氯乙烯致药疹样皮炎的机制提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

体重 (28.80 ± 2.57) g 清洁级雌性白色健康 BALB/c 小鼠 75 只 (湖南长沙斯莱克动物养殖有限公司), 三氯乙烯 (TCE, 美国 Acros Organic 公司)、弗氏完全佐剂 (FCA, 美国 Sigma 公司)、橄榄油 (中国医药上海化学试剂公司), 酶

联免疫吸附法 (ELISA) 试剂盒 (美国 Rapidbio 公司), RT-PCR 反转录试剂盒 (欧盟 Fermentas 公司), TRIzol (美国 Invitrogen 公司), PCR 扩增试剂盒 (北京 Tiangen 公司); 引物 (上海生工生物有限公司), PCR 仪 (德国 Biometra 公司), 电泳、电转移系统、Tanon 凝胶成像系统 (美国 Bio-RAD 公司), Universal 320/320R 型低温高速离心机 (德国 Hettich 公司), μ Quant 酶标仪 (美国 Bio-Tek 公司), Tanon 凝胶图像分析系统 (安徽医科大学第一附属医院中心实验室提供)。

1.2 方法

1.2.1 动物分组及致敏模型的建立 6~8 周清洁级雌性健康 BALB/c 小鼠, 经适应性饲养一星期后, 随机分为空白对照组、溶剂对照组、TCE 处理组。参考豚鼠最大值试验 (guinea pig maximization test, GPMT), 结合国外小鼠致敏模型^[5], 建立 TCE 诱导的 BALB/c 小鼠致敏模型。TCE 处理组动物, 实验前 24 h 去除动物腹部毛发, 第 1 天腹部皮内注射 50% TCE 与等量 FCA 的混合液 100 μ l, 进行初次致敏; 于第 4、7、10 天进行 3 次腹部皮肤涂抹 100 μ l 的 50% TCE (TCE: 橄榄油: 丙酮 = 5: 2: 3) 致敏; 第 17、19 天于背部皮肤涂抹 100 μ l 的 30% TCE (TCE: 橄榄油: 丙酮 = 3: 2: 5), 进行初次激发和末次激发。溶剂对照组用不含 TCE 的与致敏和激发试剂相同比例的橄榄油和丙酮混合物, 空白对照组不做任何处理。24 h 后观察记录动物皮肤反应情况, 将 TCE 处理组小鼠分为致敏组和未致敏组。并于末次激发后的相应时点进行眼静脉丛取血, 无菌取皮肤和肝脏组织。结合皮肤致敏情况和取材时点的不同, 将小鼠分为致敏 24 h、48 h、72 h、7 d 组和未致敏 24 h、48 h、72 h、7 d 组。按红斑大小记 0~4 分、水肿严重程度记 0~3 分的标准对皮肤反应进行评分, 当小鼠皮肤反应积分 ≥ 1 时即判为皮肤致敏反应阳性。

1.2.2 血清中 C3a-desArg、C4b 浓度检测 眼静脉丛取血后, 3 000 r/min 离心 15 min (离心半径 87 mm), 取血清, 采用酶联免疫吸附法 (ELISA), 操作按试剂盒 (购自美国 Rapidbio 公司) 说明书进行。

1.2.3 肝脏组织 C3、C4b 基因 mRNA 表达 采用 TRIzol 法按说明书操作步骤提取各组 BALB/c 小鼠肝脏细胞的总 RNA。以 RNA 为模板, 按照反转录试剂盒说明书进行反转录合成 cDNA, 然后对新合成的 cDNA 进行 PCR 扩增。琼脂糖凝胶电泳分离 PCR 产物, 使用凝胶图像分析系统分析结果, 各组动物 C3/GAPDH、C4b/GAPDH 的条带灰度比值作为统计数据分

收稿日期: 2012-07-25; 修回日期: 2012-09-28

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (38072147)

作者简介: 张家祥 (1985—), 男, 硕士研究生, 研究方向: 职业毒理学。

通讯作者: 朱启星, 教授, 博士生导师, E-mail: zqxing@yeah.net。

析 mRNA 表达情况。见表 1。

1.2.4 统计学处理 数据应用 SPSS 11.0 软件分析, 所有计量资料均以 ($\bar{x} \pm s$) 表示, 组间差异采用单因素方差分析,

组间比较采用最小显著差数法 (LSD 法), $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

表 1 基因 RT-PCR 引物序列及 PCR 反应条件

基因	正向引物 (5'-3')	反向引物 (5'-3')	产物	退火温度 (°C)	循环数
C3	tacaacgtagaggccacatcc	gcaggtgactttgctttgag	393	60.0	35
C4b	ggettectgattctatgaccac	actcacagccacatcatcattc	206	60.0	35
GAPDH	aggccggctgctgagtagtgc	tgcttgcttcaccacctct	460	58.7	35

2 结果

2.1 小鼠致敏情况

激发后空白对照组及溶剂对照组背部皮肤均未发现红斑和水肿, TCE 处理组 63 只小鼠中有 23 只背部皮肤出现不同程度的红斑和水肿, 小鼠致敏率达 36.5%, 致敏强度为中度。

2.2 血清 C3a-desArg、C4b 浓度检测

激发后 TCE 处理组中, 24 h、48 h、72 h、7 d 致敏组血清 C3a-desArg 浓度明显高于空白对照组及溶剂对照组, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$); 各组别中致敏组浓度明显高于未致敏组, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$); 且 48 h、72 h 致敏组与 7 d 致敏组相比也有明显差异 ($P < 0.05$)。24 h、48 h、72 h 致敏组血清 C4b 浓度与空白对照组、溶剂对照组比较有明显升高, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$), 7 d 致敏组与空白对照组、溶剂对照组相比差异无统计学意义 ($P > 0.05$);

同时, 24 h、48 h、72 h 致敏组与其相对应的未致敏组相比, 血清 C4 浓度明显升高 ($P < 0.05$)。详见表 2。

2.3 肝脏组织中 C3、C4b mRNA 表达

应用 RT-PCR 技术检测各组小鼠肝脏组织中 C3、C4b mRNA 表达情况, 灰度值分析显示 24 h、48 h 致敏组与空白对照组、溶剂对照组、各自未致敏组相比 C3 mRNA 表达明显增强 ($P < 0.05$), 但是 72 h 致敏组 C3 mRNA 有明显的降低, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$), 7 d 致敏组表达无统计学意义 ($P > 0.05$)。同时, 24 h、48 h 致敏组肝脏组织 C4b mRNA 表达与空白对照组、溶剂对照组、各自未致敏组相比明显升高, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$), 72 h 致敏组 C4b mRNA 表达与空白对照组及溶剂对照组相比明显降低 ($P < 0.05$), 7 d 致敏组表达无统计学意义 ($P > 0.05$)。详见表 2、图 1。

表 2 不同组别 TCE 致敏小鼠血清 C3a-desArg、C4b 浓度及灰度值 C3/GAPDH、C4b/GAPDH 的变化 ($\bar{x} \pm s$)

组别	动物数	血清 (ng/L)		灰度值	
		C3a-desArg	C4b	C3/GAPDH	C4b/GAPDH
空白对照组	6	62.47 ± 6.04	181.05 ± 51.64	0.81 ± 0.07	0.66 ± 0.08
溶剂对照组	6	66.10 ± 9.28	182.64 ± 36.88	0.78 ± 0.03	0.73 ± 0.13
24 h 致敏组	6	83.24 ± 3.18 ^{abc}	311.05 ± 19.58 ^{abcd}	1.15 ± 0.09 ^{abc}	0.85 ± 0.12 ^{abc}
24 h 未致敏组	9	60.35 ± 6.50	176.84 ± 35.16	0.75 ± 0.10	0.74 ± 0.13
48 h 致敏组	6	86.47 ± 5.66 ^{abcd}	360.80 ± 24.26 ^{abcd}	1.20 ± 0.13 ^{abc}	0.89 ± 0.09 ^{abc}
48 h 未致敏组	10	60.98 ± 6.64	135.24 ± 40.70	0.93 ± 0.17	0.70 ± 0.05
72 h 致敏组	6	87.35 ± 9.81 ^{abcd}	375.36 ± 30.83 ^{abcd}	0.47 ± 0.07 ^{abc}	0.42 ± 0.06 ^{abcd}
72 h 未致敏组	10	69.46 ± 5.68	172.53 ± 43.59	1.08 ± 0.14	0.62 ± 0.03
7 d 致敏组	5	75.95 ± 5.38 ^{ab}	227.59 ± 21.48	1.09 ± 0.09	0.55 ± 0.10
7 d 未致敏组	11	69.61 ± 6.27	238.96 ± 26.21	0.66 ± 0.16	0.73 ± 0.15

注: a, 与空白对照组相比, $P < 0.05$; b, 与溶剂对照组相比, $P < 0.05$; c, 与相应未致敏组相比, $P < 0.05$; d, 与 7 d 致敏组相比, $P < 0.05$ 。

图 1 TCE 致敏小鼠各组肝脏细胞 C3、C4b mRNA 表达

3 讨论

近年来职业性 DMLT 是严重危害作业工人的职业病,一些研究发现患者出现的肝脏损伤会有补体在内的免疫性指标异常,提示 DMLT 的发病过程中补体激活可能起着重要的作用。肝脏是补体产生的重要器官,约 90% 的 C3 是由肝脏产生。C3 经 3 个途径均活化为 C3a 及 C3b, C3a 在体内迅速转换为 C3a-desArg, C3b 与其他补体成分一起经一系列步骤形成攻膜复合物 C5b-9^[6]。C4 经活化途径活化后转化为 C4a 及 C4b,本研究以 C4b 的基因表达反应 C4 的基因表达情况。

越飞^[7]等发现 DMLT 患者治疗前体内补体含量明显低于治疗后,认为 DMLT 患者病程中可能存在补体活化,从而导致肝脏损伤。本课题组的前期研究发现 TCE 致敏豚鼠肝脏有一定的损伤,且血清中补体 C3、C4 含量降低,补体系统可能被激活。本研究发现 TCE 致敏组小鼠血清 C3a-desArg、C4b 浓度在 24 h 开始升高,与空白对照组、溶剂对照组及相应未致敏组相比差异有显著统计学意义。提示此阶段 C3、C4 可能处于活化状态,7 d 致敏组小鼠血清 C3a-desArg、C4b 开始降低,其中 C4b 已降低到正常水平,这与本实验室前期的肝脏损伤研究一致^[8]。

RT-PCR 研究发现 TCE 处理组小鼠中,24 h、48 h 致敏组 C3、C4b mRNA 表达升高,灰度值统计分析差异有统计学意义 ($P < 0.05$),提示此时肝脏中补体产生量应该增加;但在前期的各项研究中血清补体浓度都明显降低,提示在此阶段可能存在一定程度的补体活化。本研究发现在 TCE 致敏 72 h 组 C3、C4b mRNA 表达明显降低。本课题组前期研究发现 72 h 致敏组肝脏损伤最严重,提示 C3、C4b mRNA 表达的降低可能与肝脏的损伤程度有关。7 d 致敏组 C3、C4b mRNA 表达恢复至正常水平,这与 ELISA 检验结果相一致。

综上所述,本研究通过整体动物实验方法,检测血清中 C3a-desArg 及 C4b 的浓度及肝脏组织中 C3 及 C4b mRNA 表

达,进一步为 TCE 致敏小鼠体内补体激活提供证据。但补体活化为三氯乙烯药疹样皮炎的病程中起什么样的作用,其具体的作用机制是什么,如激活的补体最后形成膜攻击复合物 C5b-9 (MAC)^[9],MAC 是否在肝脏损伤中起到一定的作用,还需要做进一步的研究。

参考文献:

- [1] 刘移民,艾宝民,王致. 我国三氯乙烯职业危害研究十年回顾 [J]. 中国工业医学杂志,2007,20 (2): 120-121.
- [2] 夏丽华,丘朗逸,张莹,等. 三氯乙烯药疹样皮炎的研究概况 [J]. 中华劳动卫生职业病杂志,2006,24 (12): 764-766.
- [3] Tang Xiaojiang, Que Bingling, Song Xiangrong, et al. Characterization of liver injury associated with hypersensitive skin reactions induced by trichloroethylene in the guinea pig maximization test [J]. J Occup Health, 2008, 50: 114-121.
- [4] Singhal R, Ganey P E, Roth R A. Complement activation in cetaminophen-induced liver injury in mice [J]. J Pharmacol Exp Ther, 2012, 341 (2): 377-385.
- [5] Naoki Inagaki, Hiroichi Nagai. Analysis of the mechanism for the development of allergic skin inflammation and the application for its treatment: mouse models for the development of remedies for human allergic dermatitis [J]. J Pharmacol Sci, 2009, 110: 251-259.
- [6] Hertle E, van Greevenbroek M M, Stehouwer C D. Complement C3: an emerging risk factor in cardiometabolic disease [J]. Diabetologia, 2012, 55 (4): 881-884.
- [7] 越飞,曾泽明,李森华,等. 三氯乙烯药疹样皮炎患者体内补体等变化情况观察 [J]. 中国职业医学,2007,34 (6): 448-449.
- [8] 朱启星,徐辉,冷静,等. 三氯乙烯致敏豚鼠肝脏损害研究 [J]. 癌变·畸变·突变,2011,23 (5): 344-348.
- [9] 赵志伶,曹书华,王勇强. 膜攻击复合物 C5b-9 对创伤失血性休克大鼠肝损害的影响研究 [J]. 中国危重病急救医学,2011,23 (3): 158-161.

3-硝基-1,2,4-三唑-5-酮染毒大鼠病理学观察

Pathological observation on 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one (NTO) exposed rat

孙苑菡,杜文霞,王玉玲,张延巍,邢亚飞,许俊卿

SUN Yuan-han, DU Wen-xia, WANG Yu-ling, ZHANG Yan-wei, XING Ya-fei, XU Jun-qing

(中国兵器工业集团第五二一研究所,陕西 西安 710065)

摘要: 探讨新型含能材料 3-硝基-1,2,4-三唑-5-酮 (NTO) 对大鼠主要脏器的亚慢性毒作用。将 NTO 以食用植物油为溶剂分为 0、250、500、1000 mg/kg 剂量组给大鼠经口灌胃。染毒 90 d,每周 5 d,每天 1 次。染毒结束后处死大鼠,取心、肝、脾、肺、肾、脑、睾丸、子宫观察其病理改变。结果显示,NTO 染毒大鼠病理改变为肝细胞水肿、肝窦充血、

炎细胞浸润、中央静脉扩张、点状坏死;肾脏病变表现为小球系膜细胞增生、近端小管水肿、炎细胞浸润、细部小管细胞增生纤维化;睾丸曲细精管变细,间隙较大,仅可见基底膜单层细胞,未见向管腔内分化的初级精母细胞、次级精母细胞、精子细胞及精子,间质水肿。250、500、1000 mg/kg 剂量组睾丸系数低于对照组。提示 NTO 对大鼠的肝脏、肾脏、睾丸有一定的毒作用。

关键词: 新型含能材料; 3-硝基-1,2,4-三唑-5-酮 (NTO); 病理改变

中图分类号: R99; TQ086.5

文献标识码: B

收稿日期: 2012-01-16; 修回日期: 2012-05-31

基金项目: 兵器“十一五”预研支撑项目 (62301100401)

作者简介: 孙苑菡 (1981-),男,工程师,主要从事卫生毒理研究和职业卫生评价。