α -硫辛酸对甲基汞致大鼠脑氧化损伤的影响

杨天瑶, 徐兆发, 刘巍, 魏衍刚, 邓宇, 徐斌

(中国医科大学公共卫生学院环境卫生学教研室, 辽宁 沈阳 110001)

摘要: 目的 探讨 α -硫辛酸 (α -LA) 对甲基汞所致大鼠脑氧化损伤的影响。方法 实验用 Wistar 大鼠 40 只, 雌雄各半, 每组 10 只, 按体重随机分为 4 组。分别为对照组, 低、高甲基汞染毒组和 α -LA 预处理组。对照组和低、高甲基汞染毒组先以 0.9% 氯化钠溶液皮下注射, α -LA 预处理组皮下注射 35 $\mu\text{mol}/\text{kg}$ α -LA; 2 h 后, 对照组腹腔注射 0.9% 氯化钠溶液, 低、高甲基汞染毒组和 α -LA 预处理组腹腔注射甲基汞 4、12、12 $\mu\text{mol}/\text{kg}$, 染毒容量为 5 ml/kg; 干预隔日 1 次, 每周 3 次, 染毒每日 1 次, 每周 5 次, 连续干预与染毒 4 周。最后一次染毒 24 h 后, 在每组大鼠中随机抽取 6 只, 用水合氯醛腹腔注射麻醉, 心脏放血, 解剖取脑, 在冰浴下迅速分离大脑皮质, 制备 10% 的组织匀浆, 测定大脑皮质 Hg 含量、MDA 含量, 蛋白巯基、羰基含量及 SOD、GSH-Px 活力; 每组中其余 4 只大鼠, 用水合氯醛麻醉, 左心室灌注固定后, 解剖取脑, 在冰浴下迅速分离大脑皮质, 应用多聚甲醛固定, 免疫组化法测定 8-OHdG 含量, HE 染色进行病理学观察。结果 随着染甲基汞剂量的升高, 大鼠脑汞、MDA、蛋白羰基含量及 8-OHdG 含量阳性面积比、积分光密度值均升高, 蛋白巯基含量及 SOD 及 GSH-Px 活力明显降低, HE 染色病理损伤加重; 与单纯染高剂量甲基汞组比较, α -LA 干预组大鼠脑汞含量差异不显著, MDA、蛋白羰基含量及 8-OHdG 含量阳性面积比、积分光密度值均降低, 蛋白巯基含量、SOD 及 GSH-Px 活力均升高, HE 染色病理损伤有所恢复; 差异有统计学意义 ($P < 0.05$ 或 $P < 0.01$)。结论 α -LA 预处理对甲基汞所致大鼠脑氧化损伤有一定的拮抗作用。

关键词: 甲基汞; α -LA; 氧化损伤

中图分类号: R992

文献标识码: A

文章编号: 1002-221X(2013)03-0167-06

Effect of alpha-lipoic acid on oxidative damage of brain caused by methylmercury in rats

YANG Tian-yao, XU Zhao-fa, LIU Wei, WEI Yan-gang, DENG Yu, XU Bin

(Department of Environmental Health, School of Public Health, China Medical University, Shenyang 110001, China)

Abstract: Objective To observe the protective effect of alpha-lipoic acid (α -LA) on the oxidative damage of brain caused by methylmercury in rats. **Methods** 40 wistar rats were randomly divided into 4 groups by weight, 10 rats in each group, the first was control group, the second and third were low-and high-dose methylmercury groups, the fourth was α -LA pretreated group of α -LA. The rats in first, second and third groups were subcutaneous injected with 0.9% NaCl, the rats in fourth group were injected 35 $\mu\text{mol}/\text{kg}$ α -LA; 2 hours later, rats of first group were peritoneally injected with 0.9% NaCl, rats of second group were peritoneally injected with 4 $\mu\text{mol}/\text{kg}$ CH_3HgCl , rats of third and fourth groups were peritoneally injected with 12 $\mu\text{mol}/\text{kg}$ CH_3HgCl . The α -LA pretreatment was given in 2 days interval, 3 times a week, while methyl mercury was given everyday, 5 times a week, all lasted for 4 weeks. 24 hours after last injection of methylmercury, 6 rats in each groups were killed, taking the brains and separating the cerebral cortex on ice bath, then prepare 10% homogenate, determine the contents of Hg, MDA, protein sulfydryl, protein carbonyl in it, and the activities of SOD and GSH-Px in the homogenate. Another 4 rats remained in each group were made left ventricular perfusion with paraformaldehyde, and rapidly separated the cerebral cortex on ice bath for the determination of 8-OHdG content (by immunohistochemistry method) and the pathological examination. **Results** The results showed that compared with control group, the contents of mercury, MDA, protein carbonyl were all obviously increased ($P < 0.01$), the levels of protein sulfydryl, SOD and GSH-Px were all significantly reduced ($P < 0.01$), the 8-OHdG positive area ratio and integral light density in brain were also clearly increased too, with the exposed dose of mercury ($P < 0.01$). While the indices mentioned above in α -LA pretreated group were all improved compared with 12 $\mu\text{mol}/\text{kg}$ mercury group ($P < 0.01$ or $P < 0.05$). **Conclusion** Methylmercury can induced oxidative damage in brain of rats, while α -LA has a certain protective effect on this kind of damage.

Key words: methylmercury; alpha-lipoic acid (α -LA); oxidative damage

收稿日期: 2012-12-07

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (编号: 81172631)

作者简介: 杨天瑶 (1990—), 女, 硕士在读, 从事重金属毒理学研究。

通讯作者: 徐兆发, 教授, 博士生导师, E-mail: zfxu@mail.cmu.edu.cn.

甲基汞 (methylmercury, MeHg) 是一种存在于环境中的有害微量元素, 引起的环境污染已成为全球性问题, 并受到世界各国研究者的极大关注。已有研究表明, MeHg 能够诱发产生自由基, 从而引起脂质过氧化, 最终导致机体的损伤^[1]。氧化损伤是外来化合物对机体细胞产生毒性的主要机制之一^[2]。活性氧簇 (reactive oxygen species, ROS) 通常被认为是氧化应激的正常产物之一, 但过量的 ROS 可以加剧氧化损伤, 使胞内分子如蛋白质、DNA 等发生病理损伤^[3-4]。 α -硫辛酸 (alpha-lipoic acid, α -LA) 是一种抗氧化剂, 能够透过血脑屏障, 清除活性氧, 保护神经系统免受氧化损伤^[5-7]。本研究通过观察 α -LA 对 MeHg 染毒大鼠大脑皮质内 Hg、MDA、蛋白巯基、蛋白羰基、8-羟基脱氧鸟苷 (8-OHdG) 含量及 SOD、GSH-Px 活力和组织形态学改变的影响, 探讨 MeHg 致大鼠脑氧化损伤的机制及 α -LA 的保护作用, 为 MeHg 中毒的防治提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 动物分组及染毒

选择健康成年清洁级 Wistar 大鼠 40 只, 体重 (170 ± 10) g, 雌雄各半, 由中国医科大学实验动物中心提供。动物生产许可证号: SCXK (辽) 2008—0005, 使用许可证编号: SYXK (辽) 2008—0005, 实验动物室温度 17 ~ 23℃, 相对湿度为 45% ~ 55%, 正式实验前适应性饲养 7 d, 饲料由实验动物中心提供。

将 Wistar 大鼠按体重随机分成 4 组, 每组 10 只。第 1 组为对照组, 第 2 组为低剂量染甲基汞组, 第 3 组为高剂量染甲基汞组, 第 4 组为 α -LA 干预组。第 1、2、3 组皮下注射 0.9% 氯化钠溶液, 第 4 组皮下注射 35 μ mol/kg α -LA。2 h 后, 第 1 组腹腔注射 0.9% 氯化钠溶液, 第 2 组腹腔注射 4 μ mol/kg 氯化甲基汞溶液, 第 3、4 组腹腔注射 12 μ mol/kg 氯化甲基汞溶液, 注射容量均为 5 ml/kg。干预隔日 1 次, 每周 3 次, 染毒每日 1 次, 每周 5 次, 连续干预与染毒 4 周。

1.2 样品采集及处理

最后一次染毒 24 h 后, 在每组大鼠中随机抽取 6 只, 用水合氯醛腹腔注射麻醉, 心脏放血, 解剖取脑, 在冰浴下迅速分离大脑皮质。用于测定 Hg 含量的大脑皮质, 加入 2.0 ml 的浓硝酸过夜; 用于测定 MDA 含量, 蛋白巯基、羰基含量, SOD、GSH-Px 活力的大脑皮质, 加入预冷的 0.9% 生理盐水, 制备 10% 组织匀浆, 进行指标测定。每组其余 4 只大鼠,

左心室用多聚甲醛灌注固定后, 免疫组化法测定大脑皮质内 8-OHdG 含量, 用自动曝光显微照相系统照相, 用 MetamorphPDP10PBX51 彩色病理图文分析系统对免疫组化的切片进行图像分析。HE 染色, 用 Olympus 光学显微镜进行观察。

1.3 测定指标及方法

1.3.1 大脑皮质 Hg 含量测定 大脑皮质 Hg 含量用 F732 测汞仪的冷原子吸收法测定。

1.3.2 MDA 含量的测定 MDA 含量测定用硫代巴比妥酸 (TBA) 比色法^[8]。

1.3.3 蛋白巯基、羰基含量及 SOD、GSH-Px 活力的测定 用南京建成生物工程研究所有限公司提供的试剂盒测定。

1.3.4 8-OHdG 含量的测定 (1) 石蜡切片的制备, 大脑组织块在 4% 多聚甲醛磷酸缓冲液中固定 24 h 后取出, 用自来水冲洗 3 h, 梯度乙醇 (70%, 80%, 90%, 95%, 100% I, 100% II) 脱水; 二甲苯 I、II 透明。低熔点石蜡浸蜡包埋, 用 Leitz1512 型切片机制片, 切片厚度为 5 μ m, 用于免疫组化染色使用。置于 45℃ 水浴的平皿水中展片、贴片, 60℃ 温箱 2 h 烤片。将处理好的玻片置于 4℃ 冰箱备用。(2) 免疫组化反应: 切片用 PBS 漂洗 5 min, 3 次, 体积分数为 3% 的 H₂O₂ 室温孵育 10 min; 去离子水漂洗 5 min, 3 次; 微波法作抗原修复; 体积分数为 10% 的非免疫山羊血清封闭; 室温 20 min, 甩去血清; 滴加 100 μ l 的 1:100 稀释的 8-OHdG 单克隆抗体, 37℃, 30 min; 磷酸盐缓冲液 (PBS) 漂洗 5 min, 3 次; 滴加生物素化的山羊抗兔 IgG, 37℃, 30 min; PBS 漂洗 5 min, 3 次; 滴加 SABC, 37℃, 30 min; PBS 漂洗 5 min, 3 次; DAB 显色, 充分水洗; HE 轻度复染, 盐酸乙醇分化数秒后脱水; 透明中性树胶封片。用自动曝光显微照相系统照相, 用 MetamorphP-DP10PBX51 彩色病理图文分析系统对免疫组化的切片进行图像分析。每组取 2 只, 共 8 只大鼠, 对脑皮质进行 8-OHdG 免疫反应阳性分析。每只动物取 1 张切片, 每张切片取 5 个视野用来测定 8-OHdG 反应阳性细胞的阳性面积比 Aa (%) 和积分吸光度 IA。

1.3.5 大脑皮质一般病理学改变 (1) 石蜡切片制备: 方法同 8-OHdG 含量测定。(2) 苏木素-伊红 (HE) 染色: 将切片置于 I、II 二甲苯中各 10 min 脱蜡, 梯度乙醇 (100% I, 100% II, 95%, 90%, 80%, 70%) 各 10 min 脱苯至水化; HE 染色 5 min; 自来水冲洗切片背面; 将切片置于盐酸乙醇中分化 30 s; 自来水冲洗切片背面至切片变蓝为止,

伊红染色 10 min; 梯度乙醇脱水; 二甲苯透明, 中性树脂封片。用 Olympus 光学显微镜进行观察。

1.4 统计学方法

实验数据均以 $\bar{x} \pm s$ 表示。采用 SPSS 11.5 软件单因素方差分析进行组间差异的显著性检验, 两组间比较用 *Q* 检验 (Students-Newman-Keuls, SNK)。

2 结果

2.1 大脑皮质汞含量

各组大鼠大脑皮质中的汞含量变化见表 1。

表 1 各组大鼠脑汞含量 ($n=6, \bar{x} \pm s$) $\mu\text{g/g}$

组别	汞含量
对照组	0.82 ± 0.39
低剂量染毒组	4.87 ± 0.82**
高剂量染毒组	17.72 ± 1.36**
α-LA 干预组	16.34 ± 1.62**

注: 与对照组比较, ** $P < 0.01$ 。

表 1 可见, 随着染汞剂量的升高, 大脑皮质内总汞含量升高且呈剂量-效应关系。单纯染高剂量甲基汞组与对照组比较, 脑汞含量显著升高 ($P < 0.01$); α-LA 干预组与单纯染高剂量甲基汞组比较, 脑汞含量差异不明显, 但是显著高于对照组 ($P < 0.01$)。

2.2 MDA 含量、SOD 和 GSH-Px 活力

各组大鼠大脑皮质中 MDA 的含量、SOD 和 GSH-Px 的活力见表 2。

表 2 各组大鼠 MDA 含量、SOD 和 GSH-Px 活力 ($n=6, \bar{x} \pm s$)

组别	MDA (nmol/mg pro)	SOD (U/mg pro)	GSH-Px (U/mg pro)
对照组	2.32 ± 0.36	86.10 ± 10.34	19.10 ± 4.69
低剂量染毒组	2.93 ± 0.43*	69.16 ± 10.40**	15.54 ± 2.62
高剂量染毒组	3.78 ± 0.53**	39.03 ± 8.77**	10.92 ± 3.23**
α-LA 干预组	2.90 ± 0.49*▲▲	57.67 ± 10.97**▲▲	17.25 ± 3.46▲▲

注: 与对照组比较, * $P < 0.05$, ** $P < 0.01$; 与高剂量染毒组比较, ▲▲ $P < 0.01$ 。

从表 2 可以看出, 随着染汞剂量的升高, MDA 含量显著升高 ($P < 0.01$), SOD、GSH-Px 活力显著降低 ($P < 0.01$); 在施加 α-LA 干预后, MDA 含量显著降低 ($P < 0.01$), SOD 及 GSH-Px 活力显著升高 ($P < 0.01$)。

2.3 蛋白巯基、羰基含量

各组大鼠大脑皮质中的蛋白巯基、羰基含量的变化见表 3。

从表 3 可以看出, 单纯染低剂量甲基汞组与对照组比较, 蛋白巯基含量明显降低 ($P < 0.05$), 蛋白羰基含量变化不明显; 单纯染高剂量甲基汞组与对照组比较, 蛋白巯基含量明显降低 ($P < 0.01$), 蛋白羰基含量明显升高 ($P < 0.01$); α-LA 干预组与对照

组比较, 蛋白巯基含量明显降低 ($P < 0.05$), 蛋白羰基含量明显升高 ($P < 0.01$); 与染高剂量甲基汞组比较, α-LA 干预组蛋白巯基含量明显升高 ($P < 0.01$), 蛋白羰基含量明显降低 ($P < 0.01$)。

表 3 各组大鼠蛋白巯基和羰基含量 ($n=6, \bar{x} \pm s$)

组别	蛋白巯基 ($\mu\text{mol/g pro}$)	蛋白羰基 (nmol/mg pro)
对照组	49.72 ± 4.57	2.58 ± 0.53
低剂量染毒组	40.56 ± 5.92*	3.29 ± 0.89
高剂量染毒组	30.22 ± 6.57**	6.22 ± 0.67**
α-LA 干预组	41.03 ± 5.74*▲▲	4.85 ± 1.04**▲▲

注: 与对照组比较, * $P < 0.05$, ** $P < 0.01$; 与高剂量染毒组比较, ▲▲ $P < 0.01$ 。

2.4 8-OHdG 含量

各组大鼠大脑皮质中 8-OHdG 含量见图 1 (见封三)。8-OHdG 阳性面积比和积分光密度值见表 4。

表 4 各组大鼠 8-OHdG 阳性面积比和积分光密度值 ($n=4, \bar{x} \pm s$)

组别	阳性面积比 (Aa) (%)	积分光密度 (IOD) ($\times 10^3$)
对照组	0.12 ± 0.05	7.45 ± 2.88
低剂量染毒组	1.32 ± 0.54**	16.27 ± 5.15**
高剂量染毒组	3.55 ± 1.10**	33.86 ± 6.69**
α-LA 干预组	1.72 ± 0.73**▲▲	21.53 ± 5.60**▲▲

注: 与对照组比较, ** $P < 0.01$; 与高剂量染毒组比较, ▲▲ $P < 0.01$ 。

图 1 可见, 随着甲基汞剂量的升高, 8-OHdG 免疫反应阳性细胞数显著增多。从表 4 可以看出, 随着染甲基汞剂量的升高, 8-OHdG 免疫反应阳性面积比和积分光密度值明显升高 ($P < 0.01$); 施加 α-LA 干预后, 阳性面积比和积分光密度值明显降低 ($P < 0.01$)。

2.5 形态学观察

由图 2 (见封三) 可见, 在对照组中, 大鼠大脑皮质组织形态规则, 细胞排列均匀, 形状规则且深染; 在低剂量染毒组中细胞排列基本规则, 个别细胞出现空泡, 细胞质边缘凝集; 在高剂量染毒组中, 细胞排列杂乱无章, 出现空泡, 细胞核模糊, 细胞质边缘凝集; 施加 α-LA 干预后, 细胞排列趋向规则, 空泡细胞数减少, 正常细胞数量明显增加, 病理损伤有一定程度的恢复。

3 讨论

甲基汞是一种具有神经毒性的环境污染物, 主要侵犯中枢神经系统, 可造成语言和记忆能力障碍等, 多年来受到广大学者的关注^[9-11]。甲基汞进入人体后, 能够引起不可逆性的脑损伤, 在大脑的感觉区和

运动区蓄积量较高, 尤其在大脑后叶蓄积量最高^[12]。本实验中, 随着染汞剂量的升高, 大脑皮质内总汞含量升高且呈剂量-效应关系, 表明脑是甲基汞作用的主要靶器官之一, 甲基汞在脑中大量蓄积, 发挥神经毒性作用。

目前的研究表明, MeHg 致中枢神经系统损伤主要包括神经细胞钙稳态失衡、神经递质代谢紊乱及神经细胞氧化损伤等多种途径^[13], 氧化损伤是 MeHg 神经毒性的重要方面之一。Sarafian^[14] 等报道甲基汞可使小脑中活性氧形成率显著升高, 而活性氧是细胞过氧化损伤的起始因子, 脂质过氧化一旦启动, 即可通过自由基链式反应导致其终产物脂质过氧化水平升高。SOD 和 GSH-Px 是机体内清除自由基的特异酶类, 甲基汞在脑中蓄积可产生自由基, 当自由基堆积到一定程度时, SOD 和 GSH-Px 的活性降低, 从而使机体清除自由基的能力下降, 导致机体的脂质过氧化而致损伤。本实验中, 随着染甲基汞剂量的升高, 脂质过氧化产物 MDA 的生成量显著增加, SOD 和 GSH-Px 的活力显著降低, 其结果与上述文献一致, 说明甲基汞在脑组织中积累能够产生自由基而造成脂质过氧化损伤。

MeHg 能产生广泛的毒性效应是因为它具有很强的亲巯基性, 能与体内富含巯基的膜蛋白结合, 影响蛋白功能, 从而导致多系统毒性效应^[15]。当 MeHg 进入机体后, 主要与巯基结合, 以半胱氨酸-甲基汞复合物的形式, 在中性氨基酸的转运下透过血脑屏障在脑中蓄积^[1], 破坏含巯基物质的构成, 使含巯基酶的活性降低, 加剧了体内巯基的耗竭, 进而对机体产生一系列伤害。在正常生理状态下, 适量自由基 (ROS) 是神经系统和细胞稳态的信号调节因子, 但当机体遭受各种有害刺激时, 体内过多的自由基可导致氧化系统和抗氧化系统失衡, 从而引起 DNA、蛋白质和脂质的过氧化损伤^[16]。ROS 攻击 DNA 碱基可引起多种类型的碱基修饰, 其中以脱氧鸟嘌呤第 8 位碳原子的碱基氧化性修饰最为常见, 形成 8-OHdG。8-OHdG 性质稳定, 易于检测, 被认为是细胞内 DNA 氧化损伤的生物标志物^[17]。8-OHdG 具有突变倾向, 通常认为它是 ROS 引起突变和癌症的一个可能原因^[18]。在本实验中, 随着染汞剂量的升高, 巯基含量降低, 羧基和 8-OHdG 含量升高, 并有明显的组织病理学改变, 说明 MeHg 可通过诱导体内 ROS 生成从而加剧蛋白质和 DNA 的过氧化损伤, 并使体内巯基进一步耗竭, 降低其保护作用。

α -LA 是一种在酵母、菠菜及肉类中发现的生物

因子, 是天然的抗氧化剂^[19]。 α -LA 具有双硫五元环结构, 具有显著的亲电性和与自由基反应的能力, 它可以清除体内常见的羟基自由基 (HO)、过氧化氢 (H_2O_2)、单线态氧 (1O_2) 和次氯酸 (HClO) 等易于产生自由基的物质^[20 21]。并且, α -LA 除了具有自身抗氧化作用外, 还能与其代谢产物 DHLA 联合清除生物体内多种活性氧, 并可激活生物体内其他抗氧化物质的代谢循环, 共同发挥生物抗氧化作用^[22]。本实验在使用 α -LA 后, MDA 含量、蛋白羧基含量及 8-OHdG 含量阳性面积比、积分光密度值均降低, 蛋白巯基含量、SOD 活力、GSH-Px 活力升高; 而且组织形态学检查可见病理损伤有所恢复, 说明 α -LA 对甲基汞致大鼠脑氧化损伤具有拮抗作用, 但其具体的作用机制还有待进一步深入研究。

参考文献:

- [1] 胡卫萱, 王文华, 贾金华. 甲基汞在脑组织中的积累和脂质过氧化作用 [J]. 环境与职业医学, 2003, 20 (5): 331-333.
- [2] 郑双来. 无极汞 (氧化汞) 肾脏毒性机制研究进展 [J]. 国外医学卫生学分册, 2005, 32 (3): 175-179.
- [3] Cadet J, Bellon S, Douki T, et al. Radiation-induced DNA damage: formation, measurement, and biochemical features [J]. J Environ Pathol Toxicol Oncol, 2004, 23 (1): 33-43.
- [4] Limke T L, Atchison W D. Acute exposure to methylmercury opens the mitochondrial permeability transition pore in rat cerebellar granule cells [J]. Toxicol Appl Pharmacol, 2002, 178 (1): 52-61.
- [5] Morini M, Roccatagliata L, Dell'Eva R, et al. Alpha-lipoic acid is effective in prevention and treatment of experimental autoimmune encephalomyelitis [J]. Neuroimmunol, 2004, 148 (1-2): 146-153.
- [6] Jesudason E P, Masilamoni J G, Jesudoss K S, et al. The protective role of DL-alpha-lipoic acid in the oxidative vulnerability triggered by Abeta-amyloid vaccination in mice [J]. Mol Cell Biochem, 2005, 270 (1-2): 29-37.
- [7] 秦旭军, 海春旭. 抗氧化理论新进展——抗氧化剂网络和网络抗氧化剂. 自由基生命科学进展. 第 9 集 [M]. 北京: 原子能出版社, 2002: 121-122.
- [8] 万伯健. 卫生毒理学 [M]. 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 1991: 216-217.
- [9] Mergler D, Anderson H A, Chan L H, et al. Methylmercury exposure and health effects in human a worldwide concern [J]. A Journal of the Human Environment, 2007, 31 (1): 3-11.
- [10] Geier D A, Geier M R. An assessment of the impact of thimerosal on childhood neurodevelopmental disorders [J]. Pediatr Rehabil, 2003, 6 (2): 97-102.
- [11] Bose O'Reilly S, McCarty K M, Steckling N, et al. Mercury exposure and children's health [J]. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care, 2010, 40 (8): 186-215.
- [12] 江泉观, 纪云晶, 常元勋. 环境化学毒物防治手册 [M]. 北京: 化学工业出版社, 2004: 69-72.

(下转第 173 页)

程中多种细胞因子或致纤维化因子不断产生释放,作用于成纤维细胞,促其大量增殖、聚集和胶原合成,产生大量的细胞外基质,主要是 I 型和 III 型胶原,形成肺纤维化^[5-10]。

SiO₂ 致肺纤维化作用不仅与游离 SiO₂ 的含量高低有关,也与 SiO₂ 的晶体结构有关。通过研磨使 SiO₂ 尘粒碎裂成更小的颗粒并产生许多新鲜破碎面,这些新鲜破碎面有许多活性自由基,在体内更容易发生生物化学反应^[9,11]。

呼吸道自身防御机制能够清除吸入空气中固体颗粒,直径小于 10 μm 的颗粒才可进入下呼吸道。一般直径大于 5 μm 的尘粒被吸入后,通常被呼吸道黏膜阻挡或通过粘液纤毛排送系统咳出,不进入肺内;而小于 5 μm 的粉尘能够进入肺泡并由于气流逐步减慢及重力作用,在终末呼吸性细支气管和肺泡壁上沉积,更小的颗粒通过弥散作用在肺内沉积。SiO₂ 作为一种生产性粉尘,其致病性取决于粉尘粒径大小,粒径小于 5 μm 时为呼吸性粉尘,多可到达呼吸道深部和肺泡,易被巨噬细胞吞噬引起生物学作用,导致尘肺病的发生,其中以 1~2 μm 的颗粒致病力最强^[11]。购置的 SiO₂ 粉尘在存放状态下,粒径不能完全满足小于 5 μm,经充分研磨后,可使 SiO₂ 的粒径小于 5 μm。

本实验结果表明 SiO₂ 粉尘经过充分研磨,可以使 98.5% 粉尘粒径小于 5 μm,提高分散度。用研磨

后的 SiO₂ 粉尘配制悬液,经非暴露气管一次性染尘 8 周后可以复制成稳定的大鼠矽肺模型,极大地提高了大鼠矽肺模型的成功率。

参考文献:

- [1] 金泰虞. 职业卫生与职业医学 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2003: 249.
- [2] GBZ/T192.3—2007, 工作场所空气中粉尘测定 [S].
- [3] 王莹, 邓国祥. 实验动物矽肺不同时段 CT 与病理学表现对比 [J]. 山西医科大学学报, 2008, 39 (9): 787-790.
- [4] 金玉兰, 张文丽, 姚三巧, 等. 染矽尘大鼠血清白介素-1 和白介素-8 含量及肺泡巨噬细胞凋亡情况 [J]. 中华劳动卫生职业病杂志, 2011, 29 (8): 562-566.
- [5] 蒲新明, 温浩, 窦红, 等. 矽肺动物模型的病理观察 [J]. 中华劳动卫生职业病杂志, 2011, 29 (10): 761-765.
- [6] 高衍新, 王瑞. 矽尘致肺纤维化机制及细胞因子在矽肺纤维化中的作用 [J]. 中国工业医学杂志, 2008, 21 (1): 31-35.
- [7] 王丹, 毕长龙. 矽肺发病机制研究进展 [J]. 中国疗养医学, 2006, 15 (3): 161-162.
- [8] 李宏伟, 高秀霞, 杜海科, 等. 染矽尘大鼠肺组织 I、III 型胶原表达的变化 [J]. 武警医学院学报, 2005, 14 (6): 457-460.
- [9] 史延明, Bice Fubini, 翁少凡, 等. 游离二氧化硅粉尘致病性研究进展 [J]. 中华劳动卫生与职业病杂志, 2008, 26 (7): 439-442.
- [10] Arcangeli G, Cupelli V, Giuliano G. Effects of silica on human lung fibroblast in culture [J]. Sci Total Environ, 2001, 270: 135-139.
- [11] 鲍含诚, 范雪云. 尘肺病 [M]. 北京: 煤炭工业出版社, 2010: 41-42.
- [12] [J]. Cancer Sci, 2012, 101: 2525-2530.
- [13] Ceccatelli S, Dare E, Moors M. Methylmercury-induced neurotoxicity and apoptosis [J]. Chem Biol Interact, 2010, 188 (2): 301-308.
- [14] Sarafian T, Verty M A. Oxidative mechanisms underlying methylmercury neurotoxicity [J]. Int J Dev Neurosci, 1991, 9 (2): 147-153.
- [15] 郑徽. 汞的毒性效应及作用机制研究进展 [J]. 卫生研究, 2006, 35 (5): 663-666.
- [16] Ziech D, Franco R, Georgakilas A G, et al. The role of reactive oxygen species and oxidative stress in environmental carcinogenesis and biomarker development [J]. Chem Biol Interact, 2010, 188: 334-339.
- [17] Tasaki M, Umemura T, Suzuki Y, et al. Oxidative DNA damage and reporter gene mutation in the livers of gpt delta rats given non-genotoxic hepatocarcinogens with cytochrome P450-inducible potency [J].
- [18] 潘洪志, 李蓉. DNA 氧化损伤标志物 8-羟基脱氧鸟苷及其检测 [J]. 中国卫生检验杂志, 2003, 13 (4): 404-405.
- [19] Trujillo M, Radi R. Peroxynitrite reaction with the reduced and the oxidized forms of lipoic acid: New insight into the reaction of peroxynitrite with thiols [J]. Arch Biochem Biophys, 2002, 397 (1): 91-98.
- [20] Navari Izzo F, Quartacci M F, Sgherri C. Lipoic acid: a unique antioxidant in the detoxification of activated oxygen species [J]. Plant Physiol Biochem, 2002, 40: 463-470.
- [21] 田芳, 仲伟鉴, 应贤平. α-硫辛酸对 H₂O₂ 诱导的细胞活性氧水平及 DNA 氧化损伤的影响 [J]. 环境与职业医学, 2007, 24 (2): 180-189.
- [22] Packer L, Witt E H, Tritschler H J. Alpha-lipoic acid as a biological antioxidant [J]. Free Radic Biol Med, 1995, 19 (2): 227-250.

(上接第 170 页)

α -硫辛酸对甲基汞致大鼠脑氧化损伤的影响(正文见167~170页)

图1 各组大鼠脑皮质中8-OHdG免疫组化图像分析 ($\times 400$)

图2 各组大鼠脑皮质病理形态学改变 (HE, $\times 400$)

矽尘颗粒大小对复制大鼠矽肺模型的影响 (正文见171~173页)

图1 8周研磨组肺组织 (HE, $\times 400$)

图2 8周研磨组肺组织 I 型胶原 (IHC, $\times 400$)

图3 8周研磨组肺组织 III 型胶原 (IHC, $\times 400$)